Sistema de coordenadas cartesiano

Geometria Analítica

Prof. Rossini Bezerra

Definição

- **Sistema de Coordenadas no plano cartesiano ou espaço cartesiano ou plano cartesiano**
 - Um esquema reticulado necessário para especificar pontos num determinado "espaço" com dimensões.
- **Cartesiano** é um adjetivo que se refere ao matemático francês e filósofo Descartes que, entre outras coisas, desenvolveu uma síntese da álgebra com a geometria euclidiana.
 - Os seus trabalhos permitiram o desenvolvimento de áreas científicas como a geometria analítica, o cálculo e a cartografia.

Origem

- A idéia para este sistema foi desenvolvida em **1637** em duas obras de Descartes:
- Discurso sobre o método
 - Na segunda parte, Descartes apresenta a idéia de especificar a posição de um ponto ou objeto numa superfície, usando dois eixos que se intersectam.
- La Géométrie
 - onde desenvolve o conceito que apenas tinha sido referido na obra anterior.
- Um sistema de referência consiste em um ponto de origem, direção e sentido
- O sistema de coordenadas cartesianas é o mais próximo do mundo real,
 - Ele nos permite observar as formas da maneira mais aproximada possível do nosso modo de ver o universo.

Coordenadas cartesianas de alguns pontos do plano.

Propriedades

- **ORIGEM** (universo é uma linha)
 - Enxergar mais que uma direção e dois sentidos
 - Ponto de partida, ao qual chamamos de origem,
 - informa o sentido em que caminhamos,
 - Para a **direita** => +,
 - Para a **esquerda** => -
 - Cada ponto sobre a reta tem uma distância da origem, à qual chamamos amplitude, ou módulo
 - Desta forma, temos o nosso sistema bem caracterizado
 - Um sistema de referência como tal é chamado de sistema em **uma dimensão**
 - Porém não é algo muito útil
 - Se adicionarmos mais uma reta na origem, formando um ângulo reto com a reta anterior
 - Poderemos referenciar uma segunda direção,
 - Agora temos um sistema em **duas dimensões**, que nos permite localizar:
 - Um ponto acima e abaixo,
 - Além da direita ou Esquerda
 - Se fizermos a mesma analogia e colocarmos uma terceira reta sobre a origem do sistema anterior, fazendo um ângulo reto com ambas as retas anteriores, poderemos localizar:
 - Um objeto para frente ou para trás,
 - Além de acima ou abaixo e
 - Além da direita e esquerda,
 - Então teremos um sistema em **três dimensões**.
- A convenção mais usada nos sistemas de referência, estabelece que os sentidos:
 - **Para frente,**
 - **Para a direita e**
 - **Para cima**
 - São **positivos** e
 - Os seus **opostos** são **negativos**.

3D - Dimensão

- Um sistema de coordenadas tridimensionais pode ser obtido através desta estrutura de três eixos que se interceptam em um único ponto,
 - Ao qual chamamos de origem
 - Marca uma distinção angular entre os eixos,
 - Fazendo com que cada um seja reto em relação aos vizinhos.
 - Nos sentidos positivos coloca-se uma seta para indicar a progressão crescente dos valores.
- Num sistema como este, cada eixo recebe o nome (x,y,z) associado a variável que é expressa,
 - Representam as três direções do sistema.

Coordenadas cartesianas

Localização de pontos

- Observe o sistema anterior,
- Distribuição das variáveis em seus eixos,
 - Eixo vertical correspondente à altura
 - É convencionalmente chamado eixo "z",
 - Eixo horizontal, correspondente à largura
 - É convencionalmente chamado de eixo "x",
 - Eixo na diagonal, correspondente à profundidade,
 - É chamado de eixo "y",
- Cada segmento de eixo partindo da origem
 - Gera um **octante**,
 - O sistema (3D) tem **oito** sub-planos partindo da origem.
- A tripla ordenada no formato (x,y,z) , corresponde a um único ponto no sistema
 - O qual é encontrado através do reflexo dos valores nos eixos, da

Planos primários

- Planos primários é um conjunto de pontos sobre o gráfico que estão equidistantes dos planos formados por qualquer combinação de dois eixos.
- Suponha que definimos um dos valores da tripla ordenada, por exemplo:
 - (a,y,z) ou,
 - (x,a,z) ou,
 - (x,y,a) .
 - Onde a é uma constante.
- Em cada caso, temos um plano definido como paralelo ao plano dos dois eixos restantes,
 - Qualquer valor que seja dado às demais variáveis da tripla ordenada será projetado sobre o plano que foi definido.

Plano Cartesiano

- Pontos $A(x, y)$
- Eixo das Abscissas, Ordenadas
- Quadrantes

Algumas Conclusões

- Pense e responda:
 - Se $P(x, y)$ pertence ao eixo das abcissas, o que se pode afirmar com relação as suas coordenadas?
 - Se $P(x, y)$ pertence ao eixo das ordenadas, o que se pode afirmar com relação as suas coordenadas?
 - Se $P(x, y)$ pertence ao 1º quadrante, o que se pode afirmar com relação as suas coordenadas?
 - E se $P(x, y)$ pertencer ao 2º quadrante? E ao 3º? E ao 4º?

Ponto Médio

- Dados os pontos $A(x_A, y_A)$, $B(x_B, y_B)$ e P , que tem a mesma de distância de A e B , ou seja divide ao meio, temos que:
 - Assim (x_P, y_P) são as coordenadas do ponto médio de A e B .

Razão de Secção

- Razão de secção entre os pontos **A**(x_A , y_A), **B**(x_B , y_B), é encontrar as coordenadas de um ponto **C**(x_C , y_C) que **secciona** (divide) o segmento numa determinada razão, denominada **razão de secção**.

Razão de Secção

$$r_c = \frac{\overline{AC}}{\overline{CB}} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} r_c = \frac{x_C - x_A}{x_B - x_C} \\ r_c = \frac{y_C - y_A}{y_B - y_C} \end{array} \right.$$

Distância entre pontos

- Em um sistema bidimensional temos a distância entre dois pontos definida como

$$D2_{ab} = \sqrt{(x_b - x_a)^2 + (y_b - y_a)^2}$$

- Para um sistema tridimensional a analogia segue o mesmo raciocínio, o que nos revela a seguinte fórmula:

$$D3_{ab} = \sqrt{(x_b - x_a)^2 + (y_b - y_a)^2 + (z_b - z_a)^2}$$

Comprovação

- No plano xy a distância entre os dois pontos do sub-plano $(x,y,0)$ é $D2_{ab}$, para obter a distância no espaço, precisamos encontrar a distância $xy \rightarrow z$, mais precisamente a distância do ponto extremo, resultante do encontro dos valores de x e y , com o valor em z . Esta distância xy corresponde a $D2_{ab}$, logo:

$$D3_{ab} = \sqrt{(D2_{ab})^2 + (z_b - z_a)^2}$$

- O que define o seu valor após a substituição de $D2_{ab}$, resultando na fórmula definida anteriormente

A esfera

- Por definição, a esfera é o conjunto de todos os pontos no espaço que estão equidistantes de um ponto específico, ao qual denominamos centro. Considerando que as coordenadas de qualquer ponto são (x,y,z) e que podemos especificar um ponto de coordenadas (h,k,l) a distância entre os pontos é

$$D_{3_{ab}}^3 = \sqrt{(x - h)^2 + (y - k)^2 + (z - l)^2}$$

- Definimos $D_{3_{ab}} = R$, que é o raio da esfera, conseqüentemente:

$$R^2 = (x - h)^2 + (y - k)^2 + (z - l)^2$$

- Quaisquer conjuntos de pontos que constituem uma esfera também são delimitadores de um espaço no interior da mesma que gera um volume, o qual pode ser calculado pelo cálculo de volumes com a técnica de seccionamento por Lâminas paralelas;

Referências

- http://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_coordenadas_cartesiano
- ↑ [João Jeronimo & Marcos Antônio Nunes de Moura. *Introdução ao Cálculo vol II. 20* de março de 2013. 158 págs. Creative Commons Atribuição-Partilha \(versão 3.0\).](#) Acesso em 13 jul. 2013.
- Ir para cima ↑ [João Jeronimo & Marcos Antônio Nunes de Moura. *Introdução ao Cálculo vol II. 20* de março de 2013. 158 págs. Creative Commons Atribuição-Partilha \(versão 3.0\).](#) Acesso em 13 jul. 2013.
- Ir para cima ↑ [João Jeronimo & Marcos Antônio Nunes de Moura. *Introdução ao Cálculo vol II. 20* de março de 2013. 158 págs. Creative Commons Atribuição-Partilha \(versão 3.0\).](#) Acesso em 13 jul. 2013.

II. Distância de ponto a ponto

Coordenadas do ponto médio de um segmento

As coordenadas x_M e y_M do ponto médio do segmento $\overline{AB}$ são, respectivamente, as médias aritméticas das coordenadas dos pontos A e B.

As coordenadas do ponto médio

M do segmento $\overline{AB}$ são:

$$M \left(\frac{x_A + x_B}{2}, \frac{y_A + y_B}{2} \right)$$

GEOMETRIA ANALÍTICA – DISTÂNCIAS

II. Distância de ponto a ponto

Baricentro de um triângulo ABC

Coordenadas do baricentro G do triângulo ABC:

$$G \left(\frac{x_A + x_B + x_C}{3}, \frac{y_A + y_B + y_C}{3} \right)$$

GEOMETRIA ANALÍTICA – DISTÂNCIAS

II. Distância de ponto a ponto

Área do triângulo

Dado um triângulo de vértices A, B e C , localizado no plano cartesiano, sabe-se que a área do triângulo ABC é numericamente igual à metade do módulo do determinante formado pelas coordenadas dos pontos A, B e C :

$$A_{ABC} = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} x_A & y_A & 1 \\ x_B & y_B & 1 \\ x_C & y_C & 1 \end{vmatrix}$$

GEOMETRIA ANALÍTICA – DISTÂNCIAS

II. Distância de ponto a ponto

Condição de alinhamento de três pontos

Da expressão obtida para a área de um triângulo, podemos concluir que a condição de alinhamento para que três pontos distintos, A, B e C , estejam alinhados é:

$$\begin{vmatrix} x_A & y_A & 1 \\ x_B & y_B & 1 \\ x_C & y_C & 1 \end{vmatrix} = 0$$

GEOMETRIA ANALÍTICA – DISTÂNCIAS

III. A equação da reta $y = mx + n$

III. A equação da reta $y = mx + n$

Coefficiente angular (m)

Está relacionado ao ângulo que a reta forma com o eixo das abscissas.

$$m = \frac{\Delta Y}{\Delta X} = \frac{Y_B - Y_A}{X_B - X_A}$$

Se as escalas dos eixos x e y no gráfico são iguais, identificamos o coeficiente angular da reta com a tangente do ângulo α entre a reta e o eixo horizontal:

$$m = \operatorname{tg} \alpha$$

III. A equação da reta $y = mx + n$

Coefficiente linear (n)

Corresponde ao valor da ordenada do ponto em que a reta cruza o eixo y .

Para obtê-lo, refazemos o cálculo da declividade.

Usando a expressão obtida para m e substituindo os pontos por P e A :

$$m = \frac{(Y - Y_A)}{(X - X_A)} \Rightarrow Y - Y_A = m(X - X_A)$$

III. A equação da reta $y = mx + n$

Coefficiente linear da reta

Isolando y , teremos: $y = mx - mx_A + Y_A$

Chamando o termo constante de $n = -mx_A + Y_A$, a equação da reta, agora equação reduzida da reta, passa a ser escrita assim:

$$y = mx + n$$

Outro formato em que a equação da reta aparece (chamada equação segmentária da reta):

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$$

Nela, os coeficientes a e b são o valor de x no ponto em que $y = 0$ e o valor de y no ponto em que $x = 0$. Ou seja, a e b são os chamados cortes nos eixos x e y , respectivamente.

IV. Posições relativas entre retas no plano

Duas retas r e s inclinadas (i.e., não verticais e não horizontais) e com coeficientes angulares m_r e m_s respectivamente, quando consideradas ao mesmo tempo sobre o plano cartesiano, podem ser, uma em relação à outra:

Paralelas coincidentes: as duas retas possuem os coeficientes m e n iguais e todos os pontos em comum:

$$m_r = m_s \text{ e } n_r = n_s$$

Paralelas não coincidentes: os coeficientes angulares das duas retas são iguais, mas os lineares são distintos, e elas não apresentam pontos em comum:

$$m_r = m_s \text{ e } n_r \neq n_s$$

GEOMETRIA ANALÍTICA – DISTÂNCIAS

IV. Posições relativas entre retas no plano

Concorrentes: têm coeficientes angulares diferentes. Como consequência, as retas terão um único ponto em comum:

$$m_r \neq m_s$$

Caso particular de concorrência de retas: elas são perpendiculares.

Além de seus coeficientes serem diferentes, o produto entre eles é igual a -1 , i.e., o coeficiente angular de uma das retas é o inverso do oposto do coeficiente angular da outra.

$$m_r \cdot m_s = -1$$

GEOMETRIA ANALÍTICA – DISTÂNCIAS

1

(Unesp) Dados dois pontos, A e B, com coordenadas cartesianas $(-2, 1)$ e $(1, -2)$, respectivamente, conforme a figura:

- a) calcule a distância entre A e B.
 b) sabendo-se que as coordenadas cartesianas do baricentro do triângulo ABC são $(x_G, y_G) = (2, 1)$, calcule as

coordenadas (x_C, y_C) do vértice C do triângulo.

$$\begin{aligned} \text{a) } d_{AB} &= \sqrt{(-2 - 1)^2 + (1 + 2)^2} \\ d_{AB} &= 3\sqrt{2} \text{ u} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b) } x_G &= \frac{x_A + x_B + x_C}{3} \Rightarrow \frac{2}{3} = \frac{-2 + 1 + x_C}{3} \Rightarrow \\ \therefore x_C &= 3 \\ y_G &= \frac{y_A + y_B + y_C}{3} \Rightarrow 1 = \frac{1 - 2 + y_C}{3} \Rightarrow \\ \therefore y_C &= 4 \\ &C(3, 4) \end{aligned}$$

RESPOSTA:

GEOMETRIA ANALÍTICA – DISTÂNCIAS

5

(Uerj) No sistema de coordenadas cartesianas a seguir, está representado o triângulo ABC.

Em relação a esse triângulo:

- a) demonstre que ele é retângulo;
 b) calcule a sua área.

RESPOSTA:

$$\begin{aligned} \text{a) } A(1, 3); B(7, 1) \text{ e } C(3, 5) \\ (d_{AB})^2 &= (1 - 7)^2 + (3 - 1)^2 = 40 \\ (d_{AC})^2 &= (1 - 3)^2 + (3 - 5)^2 = 8 \\ (d_{BC})^2 &= (7 - 3)^2 + (1 - 5)^2 = 32 \\ d_{AC}^2 + d_{BC}^2 &= 8 + 32 = 40 = d_{AB}^2 \\ \text{As medidas dos lados do triângulo ABC estão de acordo com o teorema de Pitágoras, portanto, ele é retângulo.} \\ \text{b) } A_{ABC} &= \frac{\text{base} \cdot \text{altura}}{2} = \frac{d_{AC} \cdot d_{BC}}{2} = \frac{\sqrt{8} \cdot \sqrt{32}}{2} = \frac{\sqrt{256}}{2} \\ \therefore A_{ABC} &= 8 \text{ u}^2 \end{aligned}$$

GEOMETRIA ANALÍTICA – DISTÂNCIAS

(UFC-CE)

ABC é o triângulo, no plano cartesiano, com vértices $A(0, 0)$, $B(2, 1)$ e $C(1, 5)$.

Determine as coordenadas do ponto P do plano, tal que a soma dos quadrados das distâncias de P aos vértices de ABC seja a menor possível, e calcule o valor mínimo correspondente da soma.

Queremos minimizar a expressão $AP^2 + BP^2 + CP^2$.

Seja $P = (x, y)$. Logo, $AP^2 + BP^2 + CP^2 =$

$$= [(x - 0)^2 + (y - 0)^2] + [(x - 2)^2 + (y - 1)^2] + [(x - 1)^2 + (y - 5)^2] = 3x^2 - 6x + 3y^2 - 12y + 31$$

Como x e y variam independentemente um do outro, para minimizarmos a expressão acima, basta minimizarmos os binômios de grau 2:

$$f(x) = 3x^2 - 6x \text{ e } g(y) = 3y^2 - 12y.$$

Calculando-se os mínimos $\left(-\frac{\Delta}{4a}\right)$ de $f(x)$ e $g(y)$ encontramos

os valores -3 e -12 , respectivamente.

Portanto, o valor mínimo é

$$AP^2 + BP^2 + CP^2 = -3 - 12 + 31 = 16.$$

GEOMETRIA ANALÍTICA – DISTÂNCIAS

A figura representa, em um sistema ortogonal de coordenadas, duas retas, r e s , simétricas em relação ao eixo Ox , uma circunferência, com centro na origem do sistema, e os pontos $A = (1, 2)$, B , C , D , E e F correspondentes às interseções das retas e do eixo Ox , com a circunferência.

Nestas condições, determine:

- as coordenadas dos vértices B , C , D , E e F e a área do hexágono $ABCDEF$.
- o valor do cosseno do ângulo $\hat{AOB}$.

RESPOSTA:

a) Pelas simetrias das retas r e s em relação aos eixos Ox e Oy , temos: $X_A = X_E = -X_B = -X_D = 1$ e $Y_A = Y_B = -Y_D = -Y_E = 2$. Se $A = (1, 2)$, então $B = (-1, 2)$, $D = (-1, -2)$, $E = (1, -2)$.

Os segmentos $\overline{OA}$, $\overline{OB}$, $\overline{OC}$, $\overline{OD}$, $\overline{OE}$ e $\overline{OF}$ têm comprimento igual ao raio da circunferência dado por

$$OA = \sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{5}.$$

Agora:

$$X_F = OF = \sqrt{5} \text{ e } Y_F = 0,$$

$$X_C = -OC = -\sqrt{5} \text{ e } Y_C = 0$$

$$\text{Portanto: } F = (\sqrt{5}, 0) \text{ e } C = (-\sqrt{5}, 0).$$

Como os trapézios $CBAF$ e $CDEF$ são congruentes, a área do hexágono $ABCDEF$ é o dobro da área do trapézio $CBAF$, ou seja, é igual a:

$$2 \cdot \frac{(CF + AB) \cdot Y_A}{2} = (2\sqrt{5} + 2) \cdot 2 = 4\sqrt{5} + 4$$

b) No triângulo OAB , pela lei dos cossenos,

$$AB^2 = OA^2 + OB^2 - 2 \cdot OA \cdot OB \cdot \cos(\hat{AOB}) \Rightarrow$$

$$\therefore \cos(\hat{AOB}) = \frac{(\sqrt{5})^2 + (\sqrt{5})^2 - 2^2}{2 \cdot \sqrt{5} \cdot \sqrt{5}} = \frac{3}{5}$$

12

Dados a parábola $y = x^2 + x + 1$ e a reta $y = 2x + m$:

- a) Determine os valores de m para os quais a reta intercepta a parábola.
 b) Determine para qual valor de m a reta tangencia a parábola. Determine também o ponto de tangência.

RESPOSTA:

$$a) 2x + m = x^2 + x + 1 \Rightarrow x^2 - x + 1 - m = 0 \text{ e } \Delta = (-1)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (1 - m) = -3 + 4m$$

A reta interceptará a parábola se $\Delta \geq 0$, portanto:

$$-3 + 4m \geq 0 \quad \therefore m \geq \frac{3}{4}$$

b) A reta tangencia a parábola se $\Delta = 0$.

$$\therefore m = \frac{3}{4}$$

A reta terá equação $y = 2x + \frac{3}{4}$ e resolvendo o sistema:

$$\begin{cases} y = 2x + \frac{3}{4} \\ y = x^2 + x + 1 \end{cases}, \text{ teremos:}$$

$$2x + \frac{3}{4} = x^2 + x + 1 \Rightarrow 4x^2 - 4x + 1 = 0$$

$$\therefore x = \frac{1}{2} \text{ e } y = \frac{7}{4}$$

Portanto, o ponto de tangência é $\left(\frac{1}{2}, \frac{7}{4}\right)$.

EXERCÍCIOS ESSENCIAIS

GEOMETRIA ANALÍTICA – DISTÂNCIAS

13

(IBMEC-SP)

Considere, no plano cartesiano da figura, o triângulo de vértices A , B e C .

Se r é a reta suporte da bissetriz do ângulo ABC , então o coeficiente angular de r é igual a:

a) $\frac{\sqrt{3}}{3}$.

b) $-\frac{4}{3}$.

c) $\frac{4}{3}$.

d) $-\frac{3}{2}$.

e) $-\sqrt{3}$.

RESPOSTA: B

Sejam os pontos $D = (0, 1)$, $E = \left(\frac{\sqrt{3}}{AB}, 1\right)$, a medida do

ângulo formado pelo segmento $\overline{AB}$ com a horizontal no sentido anti-horário e β a medida do ângulo determinado pela reta r no vértice B . Então:

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{AD}{BD} = \frac{2}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{3}}{3} \quad \therefore \alpha = 30^\circ$$

$$\operatorname{tg}(\alpha + 2\beta) = \frac{CE}{BE} = \frac{3}{\sqrt{3}} = \sqrt{3}$$

Assim, $\beta = 15^\circ$. Se γ é o ângulo de inclinação da reta, temos: $\gamma = 180^\circ - (\alpha + \beta) = 180^\circ - (30^\circ + 45^\circ) = 135^\circ$

Seu coeficiente angular é, portanto, igual a $\operatorname{tg} 135^\circ = -1$.

EXERCÍCIOS ESSENCIAIS

GEOMETRIA ANALÍTICA – DISTÂNCIAS

TRANSLAÇÃO E ROTAÇÃO DE EIXOS

- Sejam Ox e Oy os eixos primitivos, do Sistema Cartesiano de Eixos Coordenados com origem $O(0,0)$. Sejam O_1x_1 e O_1y_1 os novos eixos coordenados com origem
- $O_1(h,k)$, depois que o sistema primitivo foi transladado. Seja $P(x,y)$ um ponto qualquer do sistema primitivo.
- Portanto, o mesmo ponto P terá Coordenadas $P(x_1,y_1)$, em relação ao novo sistema. Pela figura abaixo temos que:

$$\begin{cases} x = x_1 + h \\ y = y_1 + k \end{cases}$$

Equações de Translação no $\mathbb{R}^2$

- Observe que, fazer uma translação no $\mathbb{R}^2$ é transladar o sistema antigo (primitivo), paralelamente aos eixos Ox e Oy , para uma nova origem $O_1(h,k)$.

EXEMPLO I

- Determine as coordenadas do ponto $P(5,-3)$, em relação ao novo sistema, depois de realizado uma translação para a nova origem $O_1(-3,2)$.

- Solução: Usando as equações de translação, teremos:

$$\begin{cases} x = x_1 + h \\ y = y_1 + k \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_1 = 5 - (-3) = 8 \\ y_1 = -3 - 2 = -5 \end{cases} \Rightarrow P(x_1, y_1) = (8, -5)$$

ROTAÇÃO DE EIXOS NO $\mathbb{R}^2$

- Sejam Ox e Oy os eixos primitivos, do Sistema Cartesiano de Eixos Coordenados com origem $O(0,0)$.
- Sejam Ox_1 e Oy_1 os novos eixos coordenados depois que o sistema primitivo foi rotacionado de um ângulo θ em torno da origem $O(0,0)$.
- Logo, θ é o ângulo formado entre os eixos Ox e Ox_1 .
- Seja $P(x,y)$ um ponto qualquer do sistema primitivo.
- Portanto, o mesmo ponto P terá coordenadas $P(x_1,y_1)$, em relação ao novo sistema.

- Pela figura acima temos:

$$\begin{cases} x = \overline{OM} - \overline{NM} \\ y = \overline{NO} + \overline{OP} \end{cases}$$

No triângulo OMR: $\cos \theta = \frac{\overline{OM}}{x_1} \Rightarrow \overline{OM} = x_1 \cos \theta$ e

$$\overline{MR} = \overline{NQ} \quad \text{e}$$

$$\text{sen} \theta = \frac{\overline{NQ}}{x_1} \Rightarrow$$

$$\overline{NQ} = x_1 \text{sen} \theta. \quad \text{No triângulo PQR:} \quad \overline{QR} = \overline{NM} \quad \text{e} \quad \text{sen} \theta = \frac{\overline{NM}}{y_1} \Rightarrow \overline{NM} = y_1 \text{sen} \theta \quad \text{e}$$

$$\cos \theta = \frac{\overline{QP}}{y_1} \Rightarrow \overline{QP} = y_1 \cos \theta. \quad \text{Portanto,} \quad \begin{cases} x = \overline{OM} - \overline{NM} \\ y = \overline{NO} + \overline{QP} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = x_1 \cos \theta - y_1 \text{sen} \theta \\ y = x_1 \text{sen} \theta + y_1 \cos \theta \end{cases}$$

chamadas de **equações de rotação no $\mathbb{R}^2$** . Podemos escrever as equações de rotação na forma matricial: $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\text{sen} \theta \\ \text{sen} \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix}$, onde $[M]_\theta = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\text{sen} \theta \\ \text{sen} \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$ é chamada de **matriz de rotação de um ângulo θ** .

Exemplo (5): Determine as coordenadas do ponto $P(-2,6)$, após os eixos coordenados sofrerem uma rotação de 60° .

Exemplo 2

- Determine as coordenadas do ponto P(-2,6), após os eixos coordenados sofrerem uma rotação de 60°

- **Solução:** Usando as equações de rotação:

$$\begin{cases} -2 = x_1 \cos 60^\circ - y_1 \operatorname{sen} 60^\circ \\ 6 = x_1 \operatorname{sen} 60^\circ + y_1 \cos 60^\circ \end{cases} \quad \begin{cases} -2 = \frac{1}{2}x_1 - \frac{\sqrt{3}}{2}y_1 \\ 6 = \frac{\sqrt{3}}{2}x_1 + \frac{1}{2}y_1 \end{cases} \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} x_1 - \sqrt{3}y_1 = -4 \\ \sqrt{3}x_1 + y_1 = 12 \end{cases}$$

Resolvendo o sistema linear, teremos:

$$\begin{cases} x = -1 + 3\sqrt{3} \\ y = 3 + \sqrt{3} \end{cases}$$

Portanto, o ponto P terá novas coordenadas:

$$P(-1 + 3\sqrt{3}, 3 + \sqrt{3}).$$